Click to verify

إرشادات تجلطات الأوردة العميقة 2016

إن: Deep Vein Thrombosis) (بالإنجليزية: جلطة الأوردة العميقة) [1.2] غالباً ما تحدث جلطة الأوردة العميقة في الساق أو الفخذ، ولكن من الممكن أن تحدث أيضاً في الذراعين. [2.3] يمكن أن يحدث انفصال لهذه الجلطة الدموية في الأوردة العميقة، بحيث تنتقل [illegible]

[illegible] D-dimer. [illegible] والم في الصدر وارتفاع معدل ضربات القلب وسرعة النبض والشعور بالدوار أو الدوخة وسعال الدم والانهيار المفاجئ دون سبب واضح. ويحدث هذا عندما تنفصل الجلطة في وريد الساق وتنتقل، عادةً إلى الرئتين، حيث أن الرئتين هي مصفاة طبيعية للجلطات. راجع الطبيب فوراً إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصاباً بتخثر الدم الوريدي الرئوي، حيث يرتفع معدل الوفاة بسرعة إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب. يتم تشخيص الجلطات الوريدية الوريدية عن طريق الموجات فوق الصوتية ودوبلر الوريدية (موجات صوتية غير جراحية) في اختبار يجريه أخصائي الأشعة. تشمل طرق التشخيص الأخرى اختبار الدم لمادة مذيبة للجلطات في الدم تسمى [illegible]

[illegible] يوليو 2023 [illegible] 2022 [illegible] 2021 [illegible] 2020 [illegible] 2019 [illegible] 2018 [illegible] 2017 [illegible] 2016 [illegible] 2015 [illegible] 2014 [illegible] 2013 [illegible] 2012 [illegible] 2011 [illegible] 2010 [illegible] 2009 [illegible] 2008 [illegible] 2007 [illegible] 2006 [illegible] 2005 [illegible] 2004 [illegible]